



PANCREATITE CRÓNICA

A Pancreatite é considerada crónica quando existe inflamação contínua do pâncreas. A Pancreatite Crónica leva à destruição progressiva deste órgão, com perda das suas funções principais na digestão e na absorção de alimentos (insuficiência pancreática exócrina), bem como a incapacidade de produzir insulina (insuficiência pancreática endócrina).

De acordo com as queixas apresentadas, pode-se utilizar uma combinação de análises laboratoriais e outros exames complementares para confirmar o diagnóstico:

ANÁLISES LABORATORIAIS

Doseamento das enzimas pancreáticas no sangue

Testes que comprovam a insuficiência pancreática

OUTROS EXAMES SOLICITADOS

Ecografia

TAC

Ressonância Magnética

Ecoendoscopia



PANCREATITE CRÓNICA

A Pancreatite é considerada crónica quando existe inflamação contínua do pâncreas. A Pancreatite Crónica leva à destruição progressiva deste órgão, com perda das suas funções principais na digestão e na absorção de alimentos (insuficiência pancreática exócrina), bem como a incapacidade de produzir insulina (insuficiência pancreática endócrina).

De acordo com as queixas apresentadas, pode-se utilizar uma combinação de análises laboratoriais e outros exames complementares para confirmar o diagnóstico:

ANÁLISES LABORATORIAIS

Doseamento das enzimas pancreáticas no sangue

Testes que comprovam a insuficiência pancreática

OUTROS EXAMES SOLICITADOS

Ecografia

TAC

Ressonância Magnética

Ecoendoscopia